

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome Técnico:
TEMEFÓS

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA PORTARIA EM VIGOR SOBRE

Nome Comercial:
ABATE 1G

TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS

Aspecto: Grão de cor creme pardo e odor característico de mercaptana.

EPI: Luvas, botas e avental de PVC ou látex, óculos de segurança e máscara respiratória com filtro para poeiras químicas.

RISCOS

Fogo: Não inflamável. Se envolvido em incêndio pode liberar óxidos de carbono, fósforo e enxofre e aldeídos.

Saúde: O produto apresenta baixa toxicidade por absorção pela pele e por ingestão.

Meio Ambiente: O produto não apresenta risco significativo para o meio ambiente, mas evitar que atinja corpos d'água, esgoto ou sistema de drenagem.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Isolar a área. Sinalizar o local. Afastar curiosos. Eliminar todas as fontes de ignição da área. Recolher o produto vazado e os recipientes danificados em embalagens adequadas. Evitar a contaminação de fontes, lagos e rios. Avisar imediatamente a Polícia Rodoviária ou Autoridade local, BASF S/A e a Transportadora.

Fogo:

Extinção por pó químico seco, gás carbônico, espuma mecânica ou água em forma de neblina. Resfriar o recipiente com água em forma de neblina, caso esteja exposto ao fogo.

Poluição:

Evitar que o produto se acumule no meio ambiente ou que polua coleções de água. Havendo contaminação de fontes, lagos ou rios, avisar as autoridades e pessoas residentes na área, para que não se faça uso da água até a sua descontaminação.

Envolvimento de Pessoas:

Remover a vítima para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância, no mínimo por 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar as partes atingidas com água e sabão. Em caso de ingestão, dar água e provocar vômito. Se o acidentado está inconsciente e não respira mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Chamar um médico.

Informações ao médico:

Trata-se de substância inibidora da colinesterase. Antídoto: sulfato de atropina. Tratamento: Aplicar por via intravenosa ou intramuscular 2 a 4 mg (adultos) ou 0,03 a 0,05 mg/Kg (crianças) de sulfato de atropina em intervalos de 10 minutos até sinais plenos de atropinização. Após a estabilização do paciente, utilizar a dose de 1mg/hora em adultos e 0,02 mg/Kg de peso corpóreo/hora em crianças. Não utilizar Teofilina ou Aminofilina. Evitar depressores ou medicamentos que agem no sistema nervoso central.

Nome do Fabricante ou importador:

BASF S.A. - Estrada Samuel Aizemberg, 1707 São Bernardo do Campo, SP - Tel: 0800 112273